Oiseaux nicheurs des milieux urbains

Étourneaux sansonnets, moineaux domestiques et pigeons bisets

Certaines espèces, tels l'étourneau sansonnet, le pigeon et le moineau, se sont adaptées aux milieux urbains et construiront avec plaisir leur nid dans des espaces ouverts de vos maisons. Au début du printemps (mars) faites le tour de votre propriété et veillez à ce que les évents de la hotte de cuisine, de la sécheuse et de tout autre appareil de ventilation soient munis d'un grillage. Les évents non munis de grillage et les gouttières sont des endroits rêvés pour les oiseaux et les écureuils qui cherchent à se construire un nid. Les pigeons s'installeront également volontiers sur une partie abritée d'éléments architecturaux ou sur un balcon.

Que faire si un oiseau à fait son nid sur votre maison :

1) Vérifiez si le nid contient des œufs ou des oisillons. Si le nid est vide, retirez le et nettoyez l'endroit immédiatement.

2) Fermez l'ouverture avec du grillage et inspectez-là deux fois dans l'année.

Que faire si le nid contient des œufs ou des oisillons :

1) Identifiez l'espèce.

2) Essayez d'évaluer depuis combien de temps les œufs ou les oisillons sont là.

Les œufs des étourneaux et des moineaux ne prennent que 12 jours pour éclore, et les jeunes quittent le nid deux ou trois semaines plus tard.

Pour les pigeons, il faut compter 18 jours d'incubation et quatre semaines avant le départ des petits. Si vous entendez des oisillons piailler, il est fort probable que les oiseaux partiront dans moins de deux semaines.

Que faire?

La meilleure solution, pour vous et pour les oiseaux, est de ne pas toucher au nid avant le départ des jeunes. Dans la plupart des cas, cela prendra moins de trois semaines.

Une fois que le nid est vide, enlevez-le, désinfectez l'emplacement et fermez-le afin que les oiseaux ne puissent s'y installer de nouveau. Comme la plupart des pigeons, étourneaux et moineaux nichent tout l'été, il est important d'agir ainsi dès le départ des oisillons. Les jeunes passeront plusieurs jours aux alentours avec leurs parents pour apprendre à voler et se nourrir eux-mêmes.

S'il est impossible de laisser le nid en place, faites un nid artificiel dans un panier couvert ou une boîte de plastique percée de trous de drainage, et aménagez sur le devant une ouverture assez grande pour permettre aux parents d'y entrer. S'il s'agit de pigeons, il n'est pas nécessaire que le dessus soit couvert, mais assurez-vous que les jeunes soient à l'abri des intempéries. Fixez la boîte sur votre maison, le plus près possible du nid d'origine. Si la fixer à la maison est impossible, prenez une grande échelle, attachez-y la boîte et placez l'échelle le plus près possible du nid d'origine. Le nid artificiel doit être à quelques mètres seulement du nid d'origine. Cette stratégie ne fonctionnera que si les jeunes sont éclos: les parents localiseront le nid artificiel grâce aux piaillements des oisillons, ce qui est impossible avec des œufs.

Placez le nid contenant les oisillons dans la boîte ou le panier et observez à distance, pendant environ 2 heures, si les parents reviennent les nourrir. Si les parents ne reviennent pas, avant de faire quoi que ce soit d'autre, appelez Le Nichoir au 450-458-2809, ou le centre de réhabilitation le plus proche.

Le Nichoir Centre de conservation des oiseaux sauvages
637 Main, Hudson, QC J0P 1H0
450 458 2809
www.lenichoir.org
info@lenichoir.org

le Nichoir

Oiseaux nicheurs des milieux urbains

Merles d'Amérique

Les merles d'Amérique nichent fréquemment autour des habitations. Contrairement aux étourneaux et aux moineaux, ils ne nichent pas dans des ouvertures, mais ils apprécient les dessus de portes et de fenêtres, les gouttières, les luminaires des galeries et mêmes les jardinières suspendues.

Les merles d'Amérique sont des oiseaux sauvages indigènes protégés par la loi ; il est illégal de déplacer, retirer ou toucher leurs nids, leurs œufs ou leurs oisillons.

Chez le merle, l'incubation dure deux semaines et les oisillons quittent le nid au bout de deux autres semaines. Pendant quelques autres jours vous verrez probablement les jeunes sur votre terrain, en train d'apprendre à voler. À ce stade les parents s'en occupent encore et les protègent. Il est préférable de les laisser tranquilles et de ne les observer qu'à bonne distance.

Si vous avez un chat qui sort, il serait préférable de le garder à l'intérieur pendant cette période où les oisillons adolescents sont encore très vulnérables.

IMPORTANT

Déplacer un nid d'oiseau est illégal, sauf s'il s'agit d'étourneaux sansonnets, de moineaux domestiques ou de pigeons bisets. Si vous hésitez quant à l'espèce, n'y touchez pas. Pour vous aider à l'identifier, vous pouvez contacter Le Nichoir.

Si vous ne voulez pas vous en occuper vous-même, des sociétés de prise en charge de la faune, telle Skedaddle Contrôle de la faune sauvage, peuvent se déplacer pour évaluer la situation et, si nécessaire, déplacer les oiseaux de la façon la plus respectueuse possible.

Canards colverts

Les canards colverts aussi nichent fréquemment près des maisons, particulièrement si vous avez une piscine creusée que la cane prend pour un bassin. Elle pond jusqu'à 13 œufs qui écloront au bout de 23 à 30 jours. Comme le merle d'Amérique, le canard colvert est protégé et il est illégal de déplacer, supprimer ou toucher le nid, les œufs ou les canetons.

Si la cane a déjà pondu, tenez si possible les enfants et les animaux de compagnie éloignés afin qu'elle ne soit pas dérangée. Une fois les œufs éclos, au bout d'environ 15 h les canetons commenceront à marcher. Peu après, la mère s'en ira à pied avec sa couvée vers un plan d'eau plus grand.

Toutefois, il peut arriver que la cane conduise les canetons vers votre piscine, or, étant incapables de voler, les canetons en resteront prisonniers. Dans ce cas, faites une rampe avec une planche en bois, ou toute autre matériau disponible, afin de permettre aux canetons de sortir de l'eau. Si, à ce stade, vous constatez que la famille s'attarde, faites jouer de la musique dehors. Cela incitera la cane à s'éloigner au plus vite car elle percevra ce bruit comme une menace pour sa couvée.

Si vous trouvez un caneton tout seul, vérifiez d'abord que sa mère n'est pas à proximité. Si ce n'est pas le cas, contactez au plus vite le centre de réhabilitation le plus proche et, en attendant son transfert, placez-le dans un endroit chaud et tranquille. Ne l'observez pas, ne lui parlez pas, ne le caressez pas : il est dans une situation très traumatisante (même s'il n'en a pas l'air) qui peut réduire ses chances de survie.

Le Nichoir Centre de conservation des oiseaux sauvages
637 Main, Hudson, QC J0P 1H0
450 458 2809
www.lenichoir.org
info@lenichoir.org

le Nichoir