

Les fenêtres

Au centre de réhabilitation Le Nichoir, les collisions avec les fenêtres sont l'une des deux principales raisons pour laquelle on nous apporte des oiseaux blessés. Dans la plupart des cas, les oiseaux ont heurté une fenêtre parce que les vitres reflétaient le paysage environnant. Il arrive aussi que des oiseaux aient voulu se percher sur une plante d'intérieur située de l'autre côté de la vitre.



Comment prévenir les collisions

Il y a divers moyens de réduire les risques de collision avec les fenêtres. Dans la plupart des cas, l'objectif est de briser les reflets dans la fenêtre afin que les oiseaux voient que les vitres sont un obstacle. Étant donné que les reflets se produisent du côté extérieur, il faut placer les articles indiqués ci-dessous du côté extérieur de la vitre. Vous pouvez en utiliser plusieurs car ils ont tous des avantages et des inconvénients.

Décalcomanies/ autocollants

Placez-les du côté extérieur des vitres. Ils sont relativement peu coûteux et vous pouvez les changer au fil des saisons. Il existe aussi des autocollants transparents réfléchissant les UV qui, contrairement aux précédents, n'obstruent pas la vue.

Dessins sur les fenêtres

Faites des dessins sur vos fenêtres avec un morceau de savon, un surligneur ou un marqueur non permanent. Vous devrez recommencer après chaque averse.

Vitres salies

Vaporisez ou badigeonnez votre fenêtre avec de l'eau savonneuse, ou sale, ou mélangée à de la peinture lavable ou à du lait de chaux très dilué. Vous devrez recommencer après chaque averse.

Décorations suspendues

Fixez des ficelles ou des rubans à 10 cm d'intervalle à l'extérieur de votre fenêtre. Attachez-y des vieux CD, ou des perles, ou des pommes de pin, ou des décorations en verre, etc. Cela aidera les oiseaux à mieux la voir, tout en lui ajoutant une touche décorative.

Pour obtenir une multitude d'autres idées sur la façon de rendre vos fenêtres moins dangereuses pour les oiseaux et en savoir plus sur les risques qu'elles présentent, visitez le site internet de FLAP Canada www.flap.org (en anglais seulement).

Le Nichoir Centre de conservation des oiseaux sauvages

637 Main, Hudson, QC J0P 1H0
450 458 2809

www.lenichoir.org
info@lenichoir.org



Les fenêtres

Si vous avez des mangeoires

Placez-les soit à 1 m d'une fenêtre (environ 3 ¼ pi), soit à plus de 10 m (environ 32 pi).

Avec une mangeoire placée à 1 m de distance d'une fenêtre une éventuelle collision sera moins dangereuse pour les oiseaux, et à 10 m ou plus de la maison cette même éventualité sera faible.



Un oiseau se bat avec la fenêtre

Un oiseau qui se bat avec son propre reflet dans une fenêtre pense qu'il s'agit d'un intrus, et il cherche à le chasser de son territoire. Certaines personnes sont amenées à croire que l'oiseau cherche à entrer dans la maison.

Comme pour la prévention des collisions, il faut placer quelque chose sur l'extérieur de la fenêtre. Toutefois, même si seule une petite partie de la vitre est visible, l'oiseau continuera à se battre avec son reflet. Il faut donc couvrir la vitre au complet avec une étoffe ou un morceau de bois, ou bien la vaporiser avec de l'eau savonneuse ou de la peinture diluée. Vous pouvez également essayer de suspendre des morceaux d'aluminium devant la fenêtre : des objets brillants qui s'agitent effrayeront de nombreux oiseaux (mais pas tous). Chez l'oiseau, un tel comportement correspond généralement à l'établissement de son territoire au début de la saison de reproduction. Il devrait cesser quelques semaines plus tard, lorsque les parents auront à prendre soin de leurs oisillons.

Quand une collision se produit

Si un oiseau heurte une de vos fenêtres et ne s'envole pas immédiatement :

- Ramassez-le doucement et mettez-le dans une boîte doublée d'une serviette
- Placez la boîte dans un endroit sombre et tranquille
- Contactez un centre de réhabilitation le plus rapidement possible

Selon son état, son âge et la saison, l'oiseau aura possiblement besoin de soins spécialisés. Il se peut qu'il souffre de lésions au cerveau, aux yeux ou à la colonne vertébrale, ou de blessures internes ou d'une fracture. Il faudra alors qu'il soit traité dans un centre de réhabilitation de la faune le plus vite possible.